

# TRANSCERVIKÁLNÍ CVS – NAŠE ZKUŠENOSTI

IVANA MUSILOVÁ, MARIAN KACEROVSKÝ

PORODNICKÁ A GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA FN A LF  
HRADEC KRÁLOVÉ

# CVS - MOŽNÉ PŘÍSTUPY

TRANSABDOMINÁLNÍ



TRANSCERVIKÁLNÍ



*(Brambati Prenat Diagn 1991, Smidt-Jensen Lancet 1992, Jackson New Engl J Med 1992)*

# TRANCERVIKÁLNÍ CVS - BIOPTICKÝ FORCEPS

## METODIKA

- bioptický forceps, průměr 1.8 mm (*Schreiber Instrumente GmbH, Fridingen*)



# TRANCERVIKÁLNÍ CVS - BIOPTICKÝ FORCEPS

## METODIKA

- transcervikální inzerce pod UZ kontrolou, bez anestezie, většinou bez fixace děložního hrdla



# TRANCERVIKÁLNÍ CVS - BIOPTICKÝ FORCEPS

## METODIKA

- 1-2 inzerce forcepsu s odběrem 1-2 vzorků choriové tkáně



# TRANCERVIKÁLNÍ CVS - BIOPTICKÝ FORCEPS

## NAŠE ZKUŠENOSTI

- 16 jednočetných gravidit 12<sup>+0</sup> – 14<sup>+4</sup>
- 11 x placenta na zadní stěně, 5 x placenta na přední stěně
- 5 x nuligravida
- 2 x fixace hrdla Americkými kleštěmi
- 13 x dvě inzerce forcepsu, 3 x jedna inzerce forcepsu
- žádný výkon nebyl komplikován krvácením, zánětlivou komplikací nebo těhotenskou ztrátou
- žádná pacientka nevnímala výkon bolestivě
- dostatečné množství kvalitního materiálu

# ZÁVĚR

## Transcervikální CVS bioptickým forcepsem

- představuje alternativu transabdominálního přístupu
- poskytuje dostatečné množství kvalitního materiálu
- je pacientkami vnímám jako nebolestivý výkon

DĚKUJI ZA POZORNOST